Ministerio de la Protección Social

República de Colombia

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

Libertad y Orden

UNIVERSIDAD DEL SINU

Situación Rabia en Colombia

RICARDO LEON VEGA ARAGON

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

Libertad y Orden

SITUACIÓN DE LA RABIA EN COLOMBIA

Agosto 2009

LA RABIA

CICLOS IDENTIFICADOS EN COLOMBIA:

CICLO URBANO: Circulación en perros. Puede afectar animales domésticos y al hombre.

(En Magdalena se ha involucrado el zorro en este ciclo)

CICLO SILVESTRE: Propagado por murciélagos, zorros > gatos. Puede afectar animales domésticos y al hombre

RABIA

VARIANTES ANTIGÉNICAS DEL VIRUS DE LA RABIA EN COLOMBIA

- **Variante 1 (perro)**
- **Variante 3 (vampiro)**
- **Variante 4 (murciélago)**
- **Variante 5 (vampiro)**
- **Variante 8 (variante Zorrillo).**

Fuente: INS, ICA-CEISA, Universidad del Valle.

Incidencia de rabia en perros
Número de casos y Tasa x 10.000
Colombia: 1980 – 2009 (*)



Fuente: Informes anuales-MS/MPS, IQEN, SIVIGILA, INS (Virología y Zoonosis), LDSP e ICA-CEISA.

(*): Hasta semana 34 (16 al 22 agosto 2009) - Fuente: INS – Direcciones Territoriales de Salud, Ministerio de la Protección Social

Rabia humana - Colombia 2000 – 2009 (*)

Año	Número casos /Depto /Distrito (municipio)	Animal Transmisor	Variante Viral
2000	1 – **Putumayo** (Orito)	Perro	V1 (Perro)
2001	0	-	-
2002	0	-	-
2003	1 – **Cundinamarca** (Quipile)	Gato	V8 (Zorrillo)
2004	14 – **Chocó** (Pizarro)	Murciélago	V3 (Murciélago)
2005	3 – **Chocó** (Bajo Baudó)	Murciélago	V3 (Murciélago)
2006	2 – **Santa Marta**	Perro	V1 (Perro)
2007	2 – **Santa Marta**	Perro	V1 (Perro)
	1 – **Casanare** (San Luis de Palenque)	Murciélago	V3 (Murciélago)
2008	2 – **Cauca** (Santander de Quilichao)	Gato	V3 (Murciélago)
	1 – **Santander** (Floridablanca)	Murciélago	V3 (Murciélago)
	1 - **Cauca** (Bolívar)	Gato	Murciélago
2009	1- **Boyacá** (Moniquirá)	Gato	V4 (Murciélago)

(*): Hasta semana 34 (16 al 22 agosto 2009) - Fuente: INS – Direcciones Territoriales de Salud, Ministerio de la Protección Social

Rabia Humana por Regiones 1995-2009 (*)



ATLANTICA: 21

1995	6
1996	1
1997	6
1998	2
1999	2
2006	2
2007	2

CENTRO\ORIENTE: 3

2003	1
2008	1
2009	1

ORINOQUIA: 4

1995	2
1996	1
2007	1

OCCIDENTAL: 25

1996	4
2004	14
2005	3
2008	3

AMAZONIA: 2

1999	1
2000	1

(*): Hasta semana 34 (16 al 22 agosto 2009) - Fuente: INS – Direcciones Territoriales de Salud, Ministerio de la Protección Social

Rabia Humana por Regiones 1995-2009 (*)



(*): Hasta semana 34 (16 al 22 agosto 2009) - Fuente: INS – Direcciones Territoriales de Salud, Ministerio de la Protección Social

Ministerio de la Protección Social
República de Colombia

Libertad y Orden

CIRCULACIÓN RABIA - VARIANTE 1 (PERRO)
AÑOS 2004 - 2009 (*)



(*): Hasta semana 34 (16 al 22 agosto 2009) -
Fuente: INS – Direcciones Territoriales de Salud,
Ministerio de la Protección Social

23 Departamentos con Rabia Silvestre 2005 - 2009 (*)

Colombia - Número de Focos de Rabia Silvestre por Año

2005: 102 focos

2006: 111 focos

2007: 92 focos. En 15 departamentos: Antioquia (2); Arauca (8), Atlántico (13), Bolívar (3), Casanare (17), Cauca (1), Cesar (12), Chocó (2), Córdoba (13), Magdalena (6), Nariño (2), Norte de Santander (1), Sucre (6), Valle (2), Vichada (1).

2008: 119 focos. En 18 departamentos: Antioquia (4); Arauca (9), Atlántico (3), Bolívar (6), Casanare (16), Cauca (1), Cesar (28), Chocó (2), Córdoba (11), Guajira (1), Magdalena (6), Meta (5), Nariño (7), Norte de Santander (2), Putumayo (1), Santander (4), Sucre (12, Vichada (1).

2009(*) : 82 focos en 13 Departamentos: Antioquia(3), Arauca (12), Boyacá (1), Casanare (2), Cesar (35), Chocó (2), Córdoba (2), Guajira (1), Magdalena (5), Meta (3), Norte de Santander (1), Sucre (11, Valle (4).

(*): Hasta Semana 33 (agosto 9 al 15 de 2009) Fuente: ICA

Areas en Riesgo General de ocurrencia de rabia silvestre en Colombia



12.318.120 Bovinos a riesgo

Fuente: ICA

Riesgo general

TENDENCIA DE LA RABIA EN COLOMBIA

1. Reducción sostenida de la rabia en perros
   (ciclo urbano, Variante 1 – último caso enero de 2008 – Santa Marta).
2. En fase de eliminación de rabia humana transmitida por perro (En cumplimiento meta continental de eliminación de la rabia transmitida por perro OPS – Fecha Límite año 2012) – último caso humano por esta causa: enero de 2007 Santa Marta.
3. En ejecución estrategias de prevención, vigilancia y control de rabia transmitida por perro.
4. En ejecución estrategias de prevención, vigilancia y control de rabia silvestre, para reducir el riesgo de casos humanos por esta causa. Representa un riesgo latente por la complejidad de controlar los ciclos silvestres en selva.
5. El gato se ha involucrado como especie intermediaria entre el ciclo silvestre (murciélagos y zorros) y las personas.

ESTRATEGIAS DE CONTROL

- Fortalecer acciones de prevención, vigilancia y control en rabia urbana para alcanzar la meta de eliminación.
- Reformular y mejorar la estrategia de prevención de vigilancia y control de rabia en el ciclo silvestre con el propósito de reducir al máximo las probabilidades de casos humanos por esta causa.
- Información, Educación, Capacitación
- Aumento de coberturas vacunales: perros y gatos
- Tenencia responsable de mascotas
- Vigilancia intensificada y fortalecimiento de la red de diagnóstico
- Control de reservorios: manejo población de perros callejeros y control de murciélagos hematófagos – Vigilancia en otros animales silvestres como zorros.
- Coordinación intersectorial : Consejos de Zoonosis : (ICA - Ambiente – Salud – Universidades – M Veterinarios – Gremios – Universidades - Asociaciones Defensoras de Animales)
- Fortalecimiento institucional : salud – agricultura - ambiente.
- Participación social.